

الوحدة الثالثة:

استعمال المواد العضوية وغير العضوية

برنامج السنة الثانية بكالوريا شعبة العلوم التجريبية:
مسلك العلوم الفيزيائية



خاص بالتلميذ:

الموسم الدراسي 2016/2015

اقترح: الأستاذة خديجة زكريط

البرنامج الخاص بتدريس مادة علوم الحياة والأرض.
السنة الثانية علوم تجريبية - مسلك العلوم الفيزيائية
عنوان الوحدة: استعمال المواد العضوية وغير العضوية

الحصص		
	الأولى الإعدادية: العلاقة بين الكائنات الحية الثالثة الإعدادية: التربية الصحية. الجدع المشترك العلمي: علم البيئة.	المكتسبات القبلية
08 ساعات	<ul style="list-style-type: none"> ✻ النفايات المنزلية الناتجة عن استعمال المواد العضوية..... - التخلص من النفايات وطرق معالجتها. - الانتقاء. - تقنية إعادة الاستعمال والتصنيع. - الآثار على البيئة والصحة. ✻ التلوثات الناتجة عن استهلاك المواد الطاقية واستعمال المواد العضوية وغير العضوية في الصناعات الكيماوية والغذائية والمعدنية 	المضامين المراد دراستها والغلاف الزمني المخصص لكل منها
12 ساعات	<ul style="list-style-type: none"> - الملوثات والأوساط الملوثة. - الآثار على الصحة والبيئة والاقتصاد. - البدائل. ✻ المواد المشعة والطاقة النووية - المواد المشعة. - المزايا. - أخطار التلوث النووي. - إشكالية النفايات النووية. - البدائل البيئية. 	
07 ساعات	<ul style="list-style-type: none"> ✻ مراقبة جودة وصحة الأوساط الطبيعية 	
03 ساعات		
30 دقيقة	في بداية معالجة الوحدة.	التقويم القبلي
60 دقيقة	في منتصف الوحدة.	التقويم التكويني
60 دقيقة	عند نهاية الوحدة.	+ الدعم
90 دقيقة	عند نهاية معالجة الوحدة وينبغي أن يشمل مكونات الوحدة.	التقويم الإجمالي
34 ساعة	المجموع	

الفهرس

الصفحة	العنوان
3	تقديم عام للوحدة
4	الفصل الأول: النفايات المنزلية الناتجة عن استعمال المواد العضوية
15	الفصل الثاني: التلوثات الناتجة عن استهلاك المواد الطاقية واستعمال المواد العضوية في الصناعات الكيماوية والغذائية والمعدنية.
28	الفصل الثالث: المواد المشعة والطاقة النووية
39	الفصل الرابع: مراقبة جودة وصحة الأوساط الطبيعية
40	المعجم

تقديم عام للوحدة

أدى النمو الديموغرافي المضطرد والتطور الاقتصادي والصناعي للمجتمعات الحديثة، إلى زيادة

الاستهلاك سواء المنزلي أو الفلاحي أو الصناعي. نتج عن هذه الزيادة في الاستهلاك استعمال كميات متزايدة من المواد العضوية وغير العضوية، وهو ما ترتب عنه كميات كبيرة من النفايات، تطرح عدة مشاكل في تدبيرها وتسبب تلوثا يلحق أضرارا بالغة بالبيئة والصحة.

- * فما مظاهر التلوث الناتج عن استعمال المواد العضوية وغير العضوية؟
- * كيف يمكن تدبير هذه النفايات لتفادي آثارها السلبية؟



المطرح البلدي لمدينة آيت أورير، مكب غير مراقب وموقع غير مناسب

الفصل الأول: النفايات المنزلية الناتجة عن استعمال المواد العضوية

مقدمة:


تعتبر النفايات من أهم المشاكل البيئية المعاصرة التي تواجه دول العالم وخاصة الدول النامية، كأهم مصدر من مصادر التلوث، وذلك لأن هذه النفايات تساهم بشكل مباشر في تلوث البيئة، بما لذلك من آثار سلبية على صحة الإنسان وإنتاجيته بسبب انتشار الأمراض وزيادة نسبة الوفيات وكذا انخفاض مستويات المعيشة، وهو مشكل أضحى أمامه تدبير النفايات أمر ملح.

- فكيف يتم تدبير النفايات المنزلية؟

- ما مظاهر الآثار السلبية للنفايات المنزلية على صحة الإنسان وسلامة البيئة؟

التخلص من النفايات المنزلية وطرق معالجتها: الانتقاء.

1- حجم النفايات المنزلية ومكوناتها:



K. Zekrite.doc

(أ) حجم النفايات المنزلية بالمغرب

تقدر كمية النفايات المنزلية بالمغرب بحوالي 6,5 مليون طن في السنة، أي بمعدل 0,75Kg لكل فرد في اليوم. ويختلف هذا المعدل حسب المناطق ونمط العيش وفصول السنة، إذ يتراوح بين 0,3Kg في الوسط القروي و 1Kg في الوسط الحضري وشبه الحضري. تبقى معظم هذه النفايات دون معالجة في مطارح غير مراقبة وبدون بنية تحتية ملائمة، وهو ما بات يهدد البيئة والصحة والاقتصاد

استثمار الوثائق

1) بعد تعريف دقيق للنفايات المنزلية، حدد من خلال استغلال الشكل "أ" المشكل الذي تطرحه هذه المخلفات في المغرب.
2) تكتسي النفايات المنزلية أهمية اقتصادية، بين من خلال تحليل معطيات الشكل "ب" فيم تتجلى هذه الأهمية، واقترح حلا للمشكل المطروح.

الوثيقة 1: النفايات المنزلية مشكل له حلول

أجوبة:

(1) يتمثل المشكل في كون

النفايات المنزلية:

(2) * تتميز النفايات المنزلية المغربية

* تحتزن النفايات المنزلية

* للحصول على المواد الأولية، يتوجب خضوع النفايات

2 - الانتقاء:

أ- تعريف الانتقاء

(أ) انتقاء النفايات بالمغرب

تعمد مجموعة من الأسر المغربية في دخلها الاقتصادي على جمع وانتقاء النفايات وإعادة بيعها.



رغم الطابع غير المنظم لهذه العملية، فقد أثبتت مجموعة من التحريات التي قامت بها العديد من الجماعات المحلية بالمغرب،

أن ما يزيد عن 24% من النفايات يعاد تدويرها من خلال جمعها بهذه الطرق.

(ب) انتقاء النفايات في الدول المتقدمة

* في الدول المتقدمة، تندرج عملية الانتقاء في إطار الخدمات العمومية، وتتم على عدة

مستويات بمشاركة المستهلك وعمال

جمع النفايات المنزلية والعمال المتخصصين

* في مراكز

الانتقاء تبنت دول

الاتحاد الأوروبي

ألوانا اصطلاحية

لحاويات القمامة من

أجل تنظيم الانتقاء بالنسبة للمستهلك.

لون الحاوية	نوع النفايات
أسود	مواد عضوية وبقايا الأطعمة
أخضر	قارورات وعلب زجاجية
أصفر	قارورات بلاستيكية

K Zekrite.doc

الوثيقة 2: عملية الانتقاء تتم بطرق مختلفة

استثمار الوثائق:

بعد تعريف عملية الانتقاء، قارن بين الطريقة المعتمدة في المغرب وتلك المعتمدة في الدول


الأوروبية

* تتم عملية الانتقاء في المغرب وفي عامة الدول النامية بشكل

الانتقاء: Le tri

- * في الدول المتقدمة ينجز الانتقاء في عدة مستويات:
- من طرف
 - من طرف
 - في

ب- مراحل الانتقاء



3

رسم تخطيطي لمختلف مراحل الانتقاء

لخص في نص كيفية إنجاز عملية الانتقاء.



* تتم في عملية فرز النفايات في

* تجمع المواد المنتقاة


3- حصيلة:

|| التخلص من النفايات المنزلية وطرق معالجتها: تقنية إعادة الاستعمال والتصنيع.

1- إنتاج السماد العضوي:



الشكل "ج" دور التقليب في تهوية التربة وفي نشاط المتعضيات المتدخلة في تشكل السماد العضوي



الشكل "ب": تطور بعض أنواع المتعضيات المتدخلة في تشكل السماد العضوي حسب الزمن: يعبر تغير درجة الحرارة عن شدة نشاط المتعضيات المجهرية

مبدأ إنتاج السماد العضوي

استغلال الوثائق:

1 حدد من خلال الشكل "أ" نوع النفايات المنزلية التي تستعمل في إنتاج السماد العضوي.

2 بين من خلال الشكل "أ" و "ب" و "ج"، كيف يتشكل السماد العضوي انطلاقا من هذه النفايات، مبرزا أهمية التقليب.

3 اعط إذن تعريفا دقيقا لمبدأ إنتاج السماد العضوي وبين الأهمية الاقتصادية والبيئية لهذه التقنية

K. Zekrite.doc

أجوبة:

1) نوع النفايات المنزلية التي تستعمل في إنتاج الأسمدة العضوية هي، و هي بقايا

2) تحليل الوثائق وربط العلاقة بين تشكل السماد العضوي وتطور الحرارة والكائنات المجهرية:

* تبرز كل من وثيقة الشكل "أ" و "ب" أن

* نفس كل هذه الملاحظات يكون


* تبرز وثيقة الشكل "ج" أن عملية التقلب تكون متبوعة

* تتجلى إذن أهمية التقلب في

إنتاج السماد العضوي Compostage

3) التعريف (انظر جانبه).

* تمكن تقنية إنتاج السماد العضوي من:



2 - إنتاج غاز الميثان: (الوثيقة 5)

أجوبة:

1) نوع النفايات المنزلية التي تستعمل في إنتاج غاز الميثان هي


النسبة المئوية	طبيعة الغاز
50 à 80	الميثان CH ₄
20 à 50	ثنائي أكسيد الكربون CO ₂
0 à 0,5	هيدروكسيد الكبريت H ₂ S

الشكل "ب": مكونات البيوغاز = الغاز الإحيائي

تضم النفايات العضوية بكتيريا تسمى Methanobacterium وهي بكتيريا لاهوائية تعمل على إنتاج الطاقة اللازمة لنشاطها بالاعتماد على تفاعلات التخمر، ويصاحب ذلك تفاعلات اختزال تؤدي إلى إنتاج غاز الميثان حسب التفاعل الإجمالي:

عضوية مواد \rightarrow CH₃COOH \rightarrow CH₄ + CO₂
 (سكريات، بروتينات) أسيتات ميثان

الشكل "ج": البكتيريا اللاهوائية رائدة إنتاج غاز الميثان



إنتاج غاز الميثان


استثمار الوثائق

- 1 ما هي النفايات المنزلية المستعملة لإنتاج غاز الميثان؟
- 2 بين كيف يتم إنتاج غاز الميثان انطلاقاً من النفايات المنزلية.
- 3 استنتج الفوائد من استعمال النفايات المنزلية في إنتاج غاز الميثان واعط تعريفاً دقيقاً لهذه التقنية

5


K.Zekrite.doc

(2) طريقة إنتاج غاز الميثان:



(3) تتمثل أهمية إنتاج غاز الميثان في عدة مستويات:





- ** تتم معالجة الأدخنة قبل طرحها في الهواء عن طريق ترسيحها من الغبار والمعادن الثقيلة التي ترسل إلى محطات خاصة للطمير، تحترم الشروط البيئية.
- ** تمثل الحثالة الصلبة المتبقية: أجزاء غير قابلة للاحتراق والرماد والمواد السامة كالمعادن الثقيلة والديوكسينين حوالي 10 بالمائة من الحجم الأصلي للنفايات.
- ** تستعمل الحثالة المتبقية في الأشغال العمومية.

6

تقنية الترميد

1 باستغلال الوثيقة، صغ نصا تبرز من خلاله فيم تتمثل تقنية الترميد.

2 احسب نسبة النفايات التي يتم التخلص منها بواسطة تقنية الترميد ثم اعط مميزات هذه التقنية


K.Zekrite.doc

الترميد = Incinération

(1) تعريف الترميد: انظر الإطار.

(2) تتمثل أهمية الترميد في:





؟ التروبوسفير = الغلاف الجوي السفلي

2 - تأثير النفايات المنزلية على الصحة:

آثار الليكسيفيا على الصحة	آثار الغازات الناتجة عن احتراق النفايات المنزلية على الصحة	
تسبب الليكسيفيا تلوث المياه الجوفية بواسطة الجراثيم الممرضة والمعادن الثقيلة والمواد الكيميائية ينتج عن استهلاك هذه المياه تسممات غذائية وأوبئة.	آثارها على الصحة	الغازات الناتجة عن الاحتراق
آثار النفايات المنزلية على الصحة لخص في نص موجز آثار النفايات المنزلية على الصحة	اضطرابات في وظيفة التنفس خاصة عند الأطفال والمصابين بالربو.	أحادي أكسيد الكربون
	مادة سامة ولو بنسبة ضعيفة تؤثر على الجهاز المناعي والعصبي والهرموني. وتعتبر مادة مسرطنة.	أكسيدات الكبريت أكسيدات الأزوت
	اضطرابات تنفسية	الديوكسين
	مادة مسرطنة	مواد عضوية طيارة composés organiques volatils : COV
	الأدهيد	
	البنزن	

أجوبة

2 - تأثير النفايات المنزلية على الاقتصاد:



طورت عدة دول القطاعات الصناعية المرتبطة بإعادة استعمال وتصنيع النفايات المنزلية بهدف التخلص منها من جهة واستغلالها اقتصاديا من جهة أخرى

أثر النفايات على الاقتصاد الوطني

* تقدر كمية النفايات المنتجة بالمغرب بحوالي 6,5 ملايين طن في السنة، يلقي معظمها بدون معالجة في مطارح غير مراقبة وبدون بنية تحتية ملائمة.

* تقدر التكلفة الإجمالية المخصصة لبرنامج النفايات المنزلية ب 37 مليار درهم، يخصص منها 27 مليار لتحسين خدمات الجمع و 6 ملايين لإنجاز واستغلال مطارح مراقبة و 2,5 مليار لصيانة وتأهيل المطارح المستخدمة و 1 مليار لتطوير أنشطة الانتقاء وإعادة الاستعمال.

آثار النفايات المنزلية على الاقتصاد

- ** استخرج من خلال النص المقدم إليك تأثير النفايات المنزلية على الاقتصاد المغربي.
- ** بين كيف تجاوزت بعض دول العالم هذا العبء الاقتصادي وحدد من ضمن الدول المقدمة في البيان أيها أفضل تدبيرا للنفايات المنزلية.

8


K.Zekrite.doc

* يختص المغرب

3- حصيلة:

IV حصيلة عامة في شكل خطأة:

استعمل العبارات التالية واملأ الخطأة أسفله بما يناسب: الغازات، ملوثات صلبة، إعادة التدوير، إنتاج السماد العضوي، التقليل من الانعكاسات السلبية، الترميد، انعكاس سلبي على صحة الإنسان، الليكسيفيا، انتقاء، أخطار تلوث الماء والهواء والتربة، إنتاج البيوغاز



الفصل الثاني: التلوثات الناتجة عن استهلاك المواد الطاقية واستعمال المواد العضوية في الصناعات الكيماوية والغذائية والمعدنية.

مقدمة:

يؤدي النشاط الصناعي والنشاط الفلاحي والأنشطة المرتبطة بالاستهلاك المنزلي إلى تلوث وتدهور الأوساط الطبيعية (الهواء، الماء والتربة)، وهو ما ينعكس سلبا على هذه الأوساط البيئية ويضر بالكائنات الحية ويؤثر على الاقتصاد.

- فما هي ملوثات مختلف الأوساط الطبيعية، ما مصدرها وماهي انعكاساتها؟
- ما هي آثار تلوث الأوساط الطبيعية على البيئة والصحة والاقتصاد؟
- ما هي الحلول والبدائل للتخفيف من آثار هذه الملوثات أو الحد منها؟

1 تلوث الهواء.

ما مصادر تلوث الهواء؟ وما أثر هذه الملوثات على خصائص الهواء؟

2- الاحتباس الحراري وعلاقته بتلوث الهواء:

أ - الاحتباس الحراري ظاهرة طبيعية

ظاهرة طبيعية مسؤولة
عن احتفاظ الأرض
بمعدل درجة حرارة
تساوي $+15^{\circ}\text{C}$ ،
نتيجة احتفاظ
الغلاف الجوي
بالإشعاعات تحت
الحمراء، وبدونه يكون
هذا المعدل -18°C .

1 إشعاعات صادرة من الشمس
2 انعكاس جزء من أشعة الشمس
بفعل الغلاف الجوي وسطح الأرض
3 إشعاع يسخن الأرض مباشرة
4 تسخين الأرض وإرسال إشعاعات
تحت حمراء
5 إشعاعات تحت حمراء
6 جزء من الإشعاعات تحت الحمراء
ترسل إلى الفضاء
7 عودة جزء من الإشعاعات تحت الحمراء
إلى الأرض: الاحتباس الحراري

الآلية المؤدية إلى الاحتباس الحراري على سطح الأرض


1

** حول الخطأ إلى نص يبين آلية حدوث الانحباس الحراري ، موضحا العلاقة بين الغلاف الجوي ودرجة حرارة الأرض.

K.Zekrite.doc




ب- الأنشطة البشرية تزيد من الاحتباس الحراري للأرض.



- 1 حل منحنى الوثيقة "أ" وارتبط علاقة بينهما وبين الثورة الصناعية واستنتج أسباب التغيرات المسجلة في حرارة الأرض.
- 2 أبرز من خلال وثيقة الشكل "ب" مختلف مصادر الغازات المساهمة في الاحتباس الحراري.
- 3 بالاعتماد على معارفك، حدد عواقب ظاهرة الاحتباس الحراري على البيئة


أجوبة

4 - ثقب الأوزون وعلاقته بتلوث الهواء:



صور مأتقطة بالأقمار الاصطناعية للستراتوسفير** فوق القطب الجنوبي في فترتين متباعدتين ب 20 سنة. يعبر عن سمك طبقة الأوزون بوحددة Dobson = DU. معدل سمك طبقة الأوزون هو 300DU **الستراتوسفير = الطبقة المتوسطة للغلاف الجوي (علوم بين 10 و 50Km)


الشكل "أ": قياس تركيز غاز الأوزون في الستراتوسفير.




* الكلور عامل متلف لطبقة الأوزون، وله مصدرين:

- مصدر طبيعي: تطرحه بعض الطحالب فينتجه نحو الطبقة السفلى من الغلاف الجوي.
- مصدر ناجم عن أنشطة الإنسان الصناعية: التي تنتج غاز CFC الذي يتحرر في الجو فينتفك ويعطي الكلور.

* يتفاعل الكلور مع الأوزون حسب التفاعل:



* يعاد تكون الكلور حسب التفاعل:



(1) اعتمادا على معارفك، اعط تعريفًا للأوزون

وحدد أهمية تواجد هذه الطبقة في الغلاف الجوي للأرض.

(2) حلل معطيات الشكلين "أ" و "ب" واستنتج سبب التغير الملاحظ في سمك طبقة الأوزون فوق القطب الجنوبي.

(3) حدد عواقب هذا التغير في سمك طبقة الأوزون على صحة الإنسان.

الوثيقة 3: ثقب الأوزون وعلاقته بتلوث الهواء

أجوبة:

(1) تعريف طبقة الأوزون وأهميتها:

* الأوزون هو

* تمنع طبقة الأوزون

(2) تحليل الوثائق وتفسير سبب حدوث ثقب الأوزون:

* تحليل وثيقة الشكل "أ":

* تحليل وثيقة الشكل "ب":

* مع التقدم الصناعي،

(3) عواقب انخفاض سمك طبقة الأوزون على صحة الإنسان:

3- الأمطار الحمضية وعلاقتها بتلوث الهواء:

اعتمادا على معارفك، صغ نصا تبرز من خلاله أصل الأمطار الحمضية وآثارها على البيئة

لل نشاط رقم 2:

تعرف مختلف الملوثات وتصنيفها وحدد لائحة للملوثات التي يتعرض لها المجرى المائي القريب من بلدتك:

<u>التلوث الناتج عن النشاط الصناعي</u>	<u>التلوث الناتج عن النشاط الفلاحي</u>	<u>التلوث الناتج عن الاستعمالات المنزلية (المياه العادمة)</u>
✓ مواد صلبة عالقة. ✓ أملاح معدنية ناتجة عن صناعة الأسمدة. ✓ مواد عضوية: صناعة المواد الغذائية والدباغة والنسيج. ✓ معادن ثقيلة سامة كالزئبق، الرصاص، الكاديوم. ✓ الهيدروكربونات: الصناعة البترولية. ✓ مياه حمضية أو قاعدية. ✓ تصريف مياه ساخنة: صناعة المواد الغذائية، المحطات الحرارية والمحطات النووية.	✓ الأسمدة: أملاح معدنية: النيترات، الفوسفات... ✓ المبيدات. ✓ مواد عضوية: صناعة المواد الغذائية والدباغة والنسيج. ✓ مواد سامة كالزئبق، الرصاص، الكاديوم والهيدروكربونات: الصناعة البترولية ✓ تصريف مياه ساخنة: صناعة المواد الغذائية، المحطات الحرارية والمحطات النووية.	✓ مواد غير عضوية ✓ مواد عضوية قابلة للتحلل بفعل المتعضيات المجهرية. ✓ مواد فوسفاتية، مواد آزوتية كالحمض البولي والبروتينات. ✓ مواد منظفة ✓ متعضيات مجهرية بعضها ممرض كجراثومة الكوليرا والتفويد.

الوثيقة 5: تصنيف الملوثات حسب

1- تلوث المياه المالحة:

الوثيقة 6: تستقبل البحار والمحيطات، بالإضافة لما تجلبه الأنهار عوادم المدن والوحدات الصناعية المتموضعة على الساحل، أو زيوت المحركات التي تلقىها السفن وناقلات النفط. يؤثر هذا التلوث في جودة المياه مما يؤدي إلى نقص كبير في النشاط الإحيائي للماء، ويسبب هذا تكاثر الجراثيم الضارة التي تعيش في بيئة لاهوائية.

وتعد حوادث ناقلات النفط من أخطر مصادر تلوث مياه البحار والمحيطات، إذ يتدفق النفط مشكلا بقعة سوداء تزيد مساحة انتشارها بتوالي الأيام. تعتبر هذه الحوادث كوارث بيئية حقيقية إذ تقضي على أعداد هائلة من الأسماك والطيور والمحار والطحالب البحرية. استخراج من خلال النص مصادر تلوث المياه المالحة.



تتعرض كل من المياه العذبة (السطحية والجوفية) والمياه المالحة

تصنف المواد الملوثة للمياه حسب

III تلوث التربة.

1- العوامل الملوثة للتربة: (الوثيقة 7)

يعتبر pH التربة عاملا محددًا لنمو العديد من النباتات، إذ أن ارتفاع حمضية التربة، ينقص من قدرة النباتات على امتصاص الماء والأملاح المعدنية مثل الفوسفور والكالسيوم والمنغنيز الضرورية لحياة ونمو النباتات.

تستعمل الأسمدة في الميدان الفلاحي للرفع من الإنتاج الزراعي، والمبيدات للقضاء على المتعضيات الضارة. إلا أن الكميات غير المستعملة من طرف النبات تمكث في التربة وتصير مصدر تلوث، إذ تحتوي على معادن ثقيلة كالزرنيخ والكاديوم والكوبالت والكروم والنحاس والنيكل والرصاص والزنك والموليبدان، وهي مواد ضرورية بالنسبة للنباتات والحيوانات بكميات قليلة، لكنها تصبح سامة إذا كانت بكميات كبيرة.

المزروعات	حدود تحمل قيمة pH
القمح	$6 \leq pH \leq 7$
الذرة	$6 \leq pH \leq 7$
الشعير	$6 \leq pH \leq 7$
البطاطس	$5,8 \leq pH \leq 6,8$

الشكل "ب"
حدود تحمل بعض النباتات لتغير pH

السماذ	Cd	Co	Cr	Cu	Ni	Pb	Zn
الفوسفات الثلاثي	9	5	92	3	36	3	108
البولة	<0,1	<1	<3	<0,4	<1	<3	<1
كلورور البوتاسيوم	<0,1	<2	<3	<0,6	<4	<3	<1
الجير الفلاحي	<0,1	<1	<3	<0,2	<5	<3	<2
روث البهائم	1	6	56	62	29	16	71

الشكل "ب": تركيز المعادن الثقيلة في بعض الأسمدة

بين، من خلال الشكل "أ"، أين تتجلى خطورة استعمال الأسمدة والمبيدات واقترح تدبيراً للتقليل من حجم هذا المشكل.
قارن بين حدود تحمل مختلف النباتات لحمضية التربة، واستنتج تأثير الأمطار الحمضية على التربة ومتعضياتها.
اذكر عوامل أخرى تسبب تلوث التربة (استعن بالوثيقة 8)


1
2
3

K.Zekrite.doc

تأثير النشاط الفلاحي والصناعي على التربة

أجوبة

2 - دور التربة كوسيط لنقل الملوثات بين مختلف الأوساط:



- 3- حصيلة

تمثل التربة عنصرا أساسيا للحميلات البيئية، وتتعرض لأضرار كبيرة ناجمة عن بعض الأنشطة البشرية، ومن أهم مصادر تلوث التربة:



III آثار الملوثات على الصحة والبيئة والاقتصاد.

1- آثار التلوث على الصحة والاقتصاد:

كشفت دراسة أنجزت بكل من فرنسا والنمسا وسويسرا عن آثار التلوث الجوي الناتج عن وسائل النقل الذي سبب وفاة 2000 شخصا بالنمسا وسويسرا و 17600 بفرنسا. بالإضافة إلى ذلك يعاني عشرات الآلاف من الأطفال والبالغين من أمراض تنفسية مما يؤدي إلى آلاف الحالات الإضافية بالمستشفيات وضحايا 16 مليون يوم عمل بالنسبة للدول الثلاث وتقدر كلفة خسارات الإنتاج والعلاج بـ 26,7 مليار أورو في السنة الشكل "ب": آثار التلوث في الاقتصاد

استعمل مصطلح Smog في البداية للدلالة على الدخان Smok والضباب Fog، ويستعمل حاليا للإشارة إلى خليط الغازات والعناصر العالقة في الهواء الناتجة عن التلوث والمضرة بالصحة، تتكون ضبابية Smog بالخصوص فوق المدن الصناعية. ومن أهم مكوناتها أوزون التروبوسفير و SO_2 و NOx و CO والجزيئات الدقيقة. تتسبب هذه الضبابية في التهاب العينين والأنف والحجرة، وفي تفاقم اضطرابات القلب ومشاكل التنفس. ويعتبر الأطفال والعجزة والأشخاص الذين يعانون من الربو ومشاكل في القلب أكثر الناس تضررا. الشكل "أ": تلوث المدن وآثاره على الصحة

1 ذكر بآثار التلوث الجوي الناجمة عن غازات SO_2 و NOx و CO على الصحة، ونقص عن تأثير بعض المعادن الثقيلة مثل الرصاص، الكاديوم، النيكل، الزرنيخ والزنك على الصحة.

2 باعتمادك على وثيقة الشكل "ب"، ناقش آثار التلوث على الاقتصاد.


9

K.Zekrite.doc

تأثير التلوث الصناعي والفلاحي على الصحة والاقتصاد

أجوبة

2 - آثار التلوث على البيئة:



بحيرة تعرضت لظاهرة التخاصب

* تتلقى بعض البحيرات كمية كبيرة من الأسمدة الفلاحية (الغنية بالفوسفات والنيترات) والمواد العضوية للمياه العادمة. توفر هذه المواد تغذية مفرطة للطحالب التي تتكاثر بسرعة كبيرة على سطح الماء مؤدية إلى ما نسمي بظاهرة التخاصب. * ينجم عن ذلك حجب ضوء الشمس، وبالتالي توقف التركيب الضوئي في العمق، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة الأوكسجين. * تترسب المادة المنتجة في القعر ويؤدي تحللها الهوائي بفعل المتعضيات المجهرية إلى نفاذ الأوكسجين في العمق وظهور التخمر اللاهوائي المصاحب بتحرير مواد سامة (NH_4 , H_2S)، تساهم في موت الحيوانات.

ظاهرة التخاصب وعواقبها على الحميلة البيئية المائية

10

K.Zekrite.doc

1 ترجم النص إلى خطاطة مبسطة، تبرز من خلالها كيفية حدوث ظاهرة التخاصب وأثرها على الحميلة البيئية.

الخطاطة

ينجم عن تلوث الأوساط الطبيعية آثارا سلبية تتمثل في عدة مجالات:



III بدائل المواد الطاقية الملوثة .

1- بدائل استهلاك المواد الطاقية ذات الأصل الفيزيائي:

الشكل "أ"
كمية غاز CO₂ المنبعث
عند إنتاج 1 كيلواط ساعة
من الطاقة عند استعمال
مختلف أشكال الموارد
الطاقية

مصدر الطاقة لـ 1Kwh	فحم حجري	بتترول	غاز طبيعي	نووي	مائي (السدود)	شمسي	ريحي
كمية CO ₂ المنبعث ب g	1071	855	605	16	16	121	36

تصدر الطاقة الشمسية عن تفاعلات الانصهار النووي الحراري في الشمس، وتنتشر في الفضاء على شكل كمات (Quanta) تسمى الفوتونات تتجدد باستمرار. تختلف كمية الطاقة الشمسية المساطة على مناطق العالم في السنة (انظر الجدول). يمكن استغلال هذه الطاقة باعتماد لاقطات شمسية تلتقط حرارة الأشعة تحت الحمراء لإنتاج البخار المستعمل في توليد الطاقة الكهربائية أو بواسطة الخلايا الكهروضوئية التي تحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربائية بصفة مباشرة (انظر الصورة).



الشكل "ب": طواحين هوائية بناحية تطوان



لاقطات شمسية:
خلايا كهروضوئية


الطاقة التي يسقطها 1cm ² في السنة	المناطق
300KJ	الأسكا والنرويج
600KJ	شمال إفريقيا
800KJ	العربية السعودية وأستراليا

الشكل "ج": الطاقة الشمسية

1 اعتمادا على الشكل (أ)، حدد مصدرين للطاقة أقل تسببا في حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري يمكن استعمالها بالمغرب، مبرزا بعض المشاكل التي قد يطرحها استعمال كل واحد منها.

2 اعتمادا على الأشكال (أ) و (ب) و (ج)، علل اعتبار كل من الطاقة الشمسية والريحية بديلا لأكثر الموارد الطاقية استعمالا في الزمن الراهن.

3 – بدائل استهلاك المواد الطاقية ذات الأصل البيوكيميائي:




* ينتج البيوإتanol (الكحول الإيثيلي)

* مزايا اعتماد الوقود العضوي (البيوإتanol):

3 - بدائل أخرى:

اقترح بدائل أخرى لاقتصاد الطاقة أو للتخفيف من حدة تلوثها:



4 - حصيلة

مع تزايد الطلب العالمي على الطاقة ومحدودية الاحتياطات من مصادر الطاقة التقليدية (البترو، الغاز الطبيعي، الفحم الحجري)، لجأ الإنسان إلى البحث عن مصادر طاقة بديلة ومتجددة وأقل تأثيراً في البيئة. ومن أهم البدائل المعول عليها:

..... ↗


..... ↗

..... ↗



الفصل الثالث:

المواد المشعة والطاقة النووية



ينجز في شكل عروض من طرف المتدخلين الآتية أسماؤهم ووفق البرنامج التالي:

تاريخ الإنجاز	المتدخلون	عنوان الفقرة
		1 - المواد المشعة (تعريف، خصائص، الإنشطار النووي)
		2 - مزايا المواد الإشعاعية النشط (مجالات الاستغلال)
		3 - أخطار التلوث النووي
		4 - إشكالية النفايات النووية والبدائل البيئية
		5 - مراقبة جودة وصحة الأوساط الطبيعية

الفصل الثالث:


المواد المشعة والطاقة النووية

مقدمة:

- يعول العديد من المتخصصين في مجال الطاقة على الطاقة النووية كبديل للمصادر التقليدية، لكن التلوث النووي أضحى أحد الأخطار الجديدة التي تهدد البيئة وصحة الإنسان.
- فما هي المواد المشعة وما مزاياها؟
 - ما هي الانعكاسات السلبية الناجمة عن استعمال الطاقة النووية على البيئة والصحة وما البدائل الممكنة؟

المواد المشعة والطاقة النووية.

3- تذكير بمكونات نواة الذرة:



نويات

إلكترون

بروتون ● نوترون ●

- * تكون الذرة من نواة تدور حولها إلكترونات.
- * تتكون نواة الذرة (النوييدة) من مجموعة نويات.
- * نميز بين صنفين من النويات: النوترونات والبروتونات.
- * يسمى عدد البروتونات الذي تحتوي عليه النواة بـ عدد الشحنة ويرمز له بـ Z وهو كذلك العدد الذري للذرة التي تنتمي إليها هذه النواة.
- * يسمى عدد النويات (بروتونات + نوترونات) بـ عدد الكتلة، ونرمز له بـ A .
- * عدد النوترونات هو $N = A - Z$.
- * يشمل العنصر الكيميائي مجموعة الذرات التي لها نفس قيمة العدد الذري $Z =$ عدد الشحنة.
- * يرمز لنواة عنصر كيميائي بـ X ، تشتمل على Z بروتون و N نوترون.

A عدد النويات = عدد الكتلة

Z عدد البروتونات = عدد الشحنة العدد الذري


K.Zekrite.doc

2 - مفهوم المادة إشعاعية النشاط:

الوثيقة 2

- * تتميز بعض المواد بنشاط إشعاعي وتتجلى أهميتها في:
 - إرسالها لإشعاعات نشطة (مؤينة) وهي الإشعاعات α و β و γ : تمتلك القدرة على انتزاع إلكترونات لذرات أخرى، لدى تسمى إشعاعات نشطة = مؤينة = ionisante.
 - قابلية الانشطار النووي (التفتت) الذي يحرر كمية هائلة من الطاقة.
- * التفتت: يسمى التحول غير القابل للقلب لنواة مشعة إلى نواة أخرى بالتفتت. ويكون مصحوبا بإرسال إشعاعات.
- * نشاط إشعاعي: تفتت طبيعي لنواة غير مستقرة إلى نواة متولدة أكثر استقرارا مع انبعاث دقيقة أو عدة دقائق، تكون إشعاعات نشيطة. وهذه الظاهرة عشوائية وتلقائية.

ملحوظة: من بين 325 نوع من الذرات هناك 274 ذرة مستقرة و 51 ذرة غير مستقرة أي إشعاعية النشاط. فكل النظائر التي تملك عددا ذريا محصورا بين 84 و 117 إشعاعية النشاط. أمثلة لعناصر إشعاعية النشاط: ^{238}U , ^{14}C , ^{235}U , ^{232}Th , ^{40}K



* في سنة 1899 اكتشف Ernest Rutherford أن الاورانيوم يصدر أثناء تفكته ثلاثة أصناف من الإشعاعات صنفها حسب قدرتها على اختراق المادة (الشكل أ):

- الدقائق α :alpha


وهي نويدات الهيليوم He، يمكن توقيفها بواسطة ورقة عادية

- الدقائق β :Béta

وهي إما إلكترونات B^- أو بوزيترونات B^+ أكثر طاقة وتتطلب ورقة من الألومنيوم بسبك 6 ميليمترات لتوقيفها.

- الدقائق γ :Gamma

وهي فوتونات عالية الطاقة، وتتطلب عدة سنتمترات من الرصاص لتوقيفها.



(ب) فصل الإشعاعات المنبعثة من مواد مشعة بواسطة مجال مغناطيسي

K.Zekrite.doc

تحت تأثير مجال مغناطيسي متعامد مع اتجاه حزمة الدقائق تنفرق الأشعة الصادرة عن المصدر الإشعاعي النشاط إلى ثلاث مكونات:

alpha: تنحرف قليلا نحو الأعلى.

Béta: تنحرف كثيرا نحو الأسفل.

Gamma: غير منحرفة.

يتم الانحراف حسب مستوى متعامد مع المجال المغناطيسي.

2

الكشف عن أصناف الإشعاعات المنبعثة من المواد المشعة


استخرج مميزات المواد الإشعاعية النشاط وميز بين الدقائق المنبعثة من هذه المواد

3 - بعض خصائص النظائر إشعاعية النشاط: (الوثيقة 3)

* عمر النصف $demi\ vie$: هي المدة الزمنية التي يتطلبها تفكك نصف كتلة المادة المشعة. مثلا إذا كانت الكمية البدئية من الأرانسيوم ^{238}U هي 1g، فستبقى 0,5g من هذه المادة المشعة بعد مضي $4,46 \cdot 10^9$ سنة، أم النصف الآخر فسيقتقت إلى ^{234}Th .

* الفصيلة المشعة: هي مجموع العناصر المشعة الناتجة عن التفكك التدريجي لنفس العنصر المشع الأصلي.

* النظير الإشعاعي النشاط Isotope radioactif : هي المادة التي تمكن خاصياتها الذرية من إصدار إشعاعات مؤينة.



* تصدر الإشعاعات alpha و Béta و gamma عن النويدات الإشعاعية النشاط (الأم) التي تفتت لتعطي نويدات جديدة (بنيت). يكون هذا التفتت تدريجيا مع مرور الزمن إذ يتناقص عدد النويدات المشعة مع مرور الزمن. ويسمى عمر النصف لنويذة مشعة المدة الزمنية T اللازمة لتفتت نصف نويدات العينة (الشكل أ و ب).


* يمكن للنويدات البنيت أن تكون إشعاعية النشاط فتستمر عملية التفتت حتى الحصول على نويذة مستقرة وغير مشعة. نسمي مجموع النويدات الناتجة عن نفس النويذة الأصلية فصيلة مشعة (الشكل ج).

K.Zekrite.doc

3

اعط تعريفا دقيقا لعمر النصف، للفصيلة المشعة والنظير المشع. التناقص الإشعاعي

4 - الانشطار النووي:



الدقائق الناتجة عن التفتت رجا حراريا داخل المفاعل النووي مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في درجة الحرارة، ويستغل ذلك في المحطات الحرارية.

4

الانشطار النووي

يتم الانشطار النووي بتحريض من طرف الإنسان

لإنتاج الطاقة أبرز ذلك .

K.Zekrite.doc

داخل المفاعلات النووية، يتم تحريض الانشطار النووي لنواة مشعة مثل ^{235}U وذلك بقذفها بنوترونات حرارية (بطيئة السرعة)، تصاحب هذه الظاهرة بكميات هائلة من الطاقة، كما يتم تحرير نوترونات جديدة تساهم في سلسلة من الانشطارات المتتالية.

|| مجالات استعمال المواد الإشعاعية النشاط.

3- إنتاج الكهرباء:

نقل كهربائي

حافضة الحصر

قضبان التحكم

مولد البخار

توربين

مغناطيس

دائرة التبريد

برج التبريد

ماء تحت ضغط (دائرة أولية)

ماء (دائرة ثانوية)

بخار الماء (دائرة ثانوية)

ماء دائرة التبريد

(أ) مدخنتان أحد المفاعلات النووية المنتجة للكهرباء بالسينغال

(ب) إنتاج الكهرباء انطلاقاً من الطاقة النووية

* توجد حالياً زهاء 400 محطة نووية وظيفية في 32 دولة عبر العالم. بالنسبة للمغرب هناك مشروع إنجاز محطة بين الصويرة وأسفي، يتوقع أن تصبح وظيفية سنة 2020.

* وقد أصبحت الطاقة النووية مزوداً مهماً للكهرباء في العالم، حيث تستجيب لنحو 17 في المائة من الطلب العالمي.

5 إنتاج الطاقة الكهربائية

صف مكونات المحطات النووية وبين كيفية إنتاج الطاقة الكهربائية باستعمال الطاقة النووية.

* تتكون المحطة النووية من قلب المفاعل والأبنية الملحقة (غرفة التحكم، غرف المولدات الكهربائية، خزانات الماء، حوض التبريد).

* يمكن اختصار عمل المفاعل النووي المنتج للكهرباء كالتالي:

- يتم في قلب المفاعل النووي تفاعل انشطار الأورانيوم، مما يؤدي إلى إنتاج طاقة حرارية هائلة.

- تؤدي الطاقة المنبعثة من المفاعل إلى تسخين ماء الدارة الأولية.

- تؤدي الحرارة المنبعثة من ماء الدارة الأولية إلى تسخين ماء الدارة الثانوية فيتبخر.

- يسبب بخار الماء تحريك عنفة منوب turbine d'un alternateur فينتج عن هذه الحركات تولد كهرباء.


ملحوظة: يتم التحكم في التفاعل المتسلسل بواسطة قضبان الكاديوم والأنديموم التي تمتص جزئياً النوترونات الناتجة عن الانشطار بحيث تنتج الطاقة بكيفية منتظمة.

2- التاريخ المطلق للأجسام (كائنات، صخور)

6

طريقة التاريخ باستعمال الكربون ^{14}C المشع:

تتكون نوى الكربون ^{14}C في الطبقات الجوية العليا نتيجة تأثير الفوتونات الفضائية في الآزوت حسب التفاعل التالي:



تمتص النباتات $^{12}_6\text{C}$ و $^{14}_6\text{C}$ على شكل ثنائي أوكسيد الكربون (وكذلك الحيوانات عن طريق التغذية) وعند موتها يتوقف الامتصاص ويتناقص ^{14}C الذي تتضمنه بفعل التفتت. علما أن عمر النصف للكربون ^{14}C هو 5730 سنة، وبمقارنة النشاط الإشعاعي (a) المتبقي في النبات (أو في بقايا الحيوان) مع النشاط (a₀) لنبات حي (أو حيوان حي) من نفس الفصيلة، يمكن معرفة تاريخ موت النبات أو الحيوان المعين.

2 - في الصناعة الغذائية

المعالجة المؤينة طريقة فيزيائية تستعمل لتطهير الأغذية (مثل التوابل) والرفع من مدة



حفظها، وهي طريقة مكملة للطرق المستعملة حاليا (التبريد والطهي والمعالجة الكيميائية).


تتمثل هذه المعالجة في إخضاع الأغذية للأشعة γ (المنبعثة من الكوبالت 60 الإشعاعي النشاط) أو للأشعة X أو لحزمة إلكترونات مع احترام الشروط التي تجعل الأغذية غير سامة بالنسبة للمستهلك. تمكن هذه المعالجة من كبح الإنبات (بالنسبة للبذور) والقضاء على الجراثيم ومنع تكاثر الحشرات أو قتلها.

7

دور المواد المشعة في الميدان الصناعي

4 - دور في الميدان الطبي

التصوير بتقنية La scintigraphie فحص يتم خلاله حقن الشخص المفحوص بكميات ضئيلة من مادة إشعاعية النشاط، تنتشر داخل الجسم وتثبت على عضو أو مجموعة من الأعضاء. وبواسطة كاميرا خاصة يمكن استقبال الإشعاعات التي يرسلها العضو بشدة تختلف حسب شدة التثبيت ترتبط بدورها بطبيعة ووظيفة الخلايا. يستعمل اليود المشع لفحص الغدة الدرقية (تستعمله في تركيب الهرمونات).



صورة غير متجانسة
لغدة درقية مصابة

صورة لغدة
درقية سليمة

K.Zekrite.doc

(أ) الفحص الطبي باستعمال المواد المشعة



يعتبر العلاج بالأشعة من أهم الطرق الحالية لعلاج السرطان. تستعمل إشعاعات مؤينة ذات طاقة عالية تستهدف بدقة كبيرة الخلايا السرطانية في موقع الورم وتدمرها أصبحت المعالجة بالأشعة أساسية في معالجة سرطان الموثة والأورام الدماغية

(ب) العلاج بالأشعة

8 دور المواد المشعة في الميدان الطبي


5 - حصيلة

- تتميز المواد الإشعاعية النشاط بخاصية الانشطار التي تحرر طاقة وخاصة إرسال إشعاعات قابلة لاختراق المادة، وبذلك يستغلها الإنسان في عدة مجالات:
- لإنتاج الطاقة الكهربائية.
- لتأريخ بعض الأجسام: كائنات حية، معادن، صخور...
- لتطهير الأغذية من أجل حفظها.
- للفحص الطبي.
- للعلاج الطبي (السرطانات).
- لرصد التشققات في أنابيب نقل البترول.

III أخطار التلوث النووي.

4- مصادر الإشعاعات النووية:

أ - مختلف مصادر الإشعاعات التي يتعرض لها الإنسان



يتعرض جسم الإنسان إلى إشعاعات من مصادر متنوعة، يمكن تصنيفها إلى:


- * إشعاعات طبيعية: أشعة فضائية، نشاط إشعاعي للقشرة الأرضية، غاز الرادون الطبيعي...
- * إشعاعات اصطناعية: الفحص الطبي الإشعاعي، المواد المشعة الصادرة من المحطات النووية، الأجهزة الإلكترونية...

ب - التلوث النووي الاصطناعي



أدى انفجار محطة تشيرنوبيل يوم 26 أبريل 1986 بأوكرانيا، إلى طرح سحابة غبار كثيف وغازات مشعة في الهواء. وقد ساهمت الرياح في نشر هذه المواد على مساحات شاسعة، وتوزيع مخلفات الانفجار على مجموع أوروبا الغربية. من بين العناصر الإشعاعية النشاط المطروحة الإيود 131 الذي يتراكم بالغدة الدرقية.

(أ) التلوث الإشعاعي الناتج عن حادثة تشيرنوبيل



يطرح كل مفاعل أثناء اشتغاله العادي عدة مواد إشعاعية النشاط:

- غازية عبر المدخات، من أهمها الكزينون 133 والكربون 14 وكميات قليلة من اليود 131 والتريسيوم.
- سائلة: تطرح في الأنهار والبحار المجاورة، تحتوي أساساً على التريسيوم وقليل من الكوبالت والنيكل.
- صلبة: تمثل النفايات النووية التي تخزن في موقع المفاعل أو في مواقع خاصة.


(ب) التلوث النووي الصناعي

استخرج من خلال الشكلين (أ) و (ب) بعض مصادر ومظاهر التلوث النووي وحدد مصادر أخرى محدثة لهذا التلوث

10 التلوث الاصطناعي

- * يصدر التلوث النووي عن أنشطة صناعية بشرية:
- من خلال الاشتغال العادي للمحطات النووية المنتجة للكهرباء.
- خلال التجارب النووية التي تقوم بها الدول المصنعة بهدف تطوير الأسلحة الذرية.
- خلال الحوادث التي يمكن أن تلحق بالمحطات النووية: حادث تشيرنوبل.
- * تطرح هذه المفاعلات نفايات نووية غازية، سائلة وصلبة.

5- أخطار التلوث النووي على الصحة والبيئة:



(أ) آثار الإشعاعات النووية في البيئة

(ب) الآثار البيولوجية للإشعاعات النووية

هي الآثار الملاحظة عندما تتفاعل الإشعاعات المؤينة مع الأنسجة الحية وتنقل طاقتها للجزيئات العضوية. ترتبط خطورة هذه الآثار بنوعية الإشعاع (α , β , γ) وشدته وطول المدة التي يتعرض فيها الإنسان لهذا الإشعاع. يقدر الحد الأقصى للإشعاع النووي الموجود في الهواء الذي يجب ألا يتعرض الإنسان لحد أعلى منه بنحو 50mSv في اليوم.

بينت عدة دراسات ولاسيما تلك التي أجريت إثر انفجار تشيرنوبيل، العلاقة بين التعرض للإشعاعات وزيادة احتمال الإصابة بالسرطان.

✓ أبرز من خلال الشكلين (أ) و (ب) كيفية نقل المواد الإشعاعية النشاط

عبر الشبكات الغذائية وتأثير هذه المواد على صحة الإنسان

11 آثار الإشعاعات النووية في البيئة وصحة الإنسان

يصاحب استغلال الإنسان للمواد الإشعاعية النشاط انبعاث إشعاعات في الطبيعة تحدث أضرار بالبيئة وبالكائنات الحية وأهمها:

* أضرار على البيئة، حيث يصل جزء من الملوثات الإشعاعية النشاط بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى التربة والأوساط المائية مما يؤدي إلى تلوث الكائنات الحية وتراكم المواد الإشعاعية النشاط عبر حلقات السلاسل الغذائية.

* أضرار بيولوجية بسبب تفاعل الأشعة المؤينة مع الأنسجة، وهو ما يرفع من احتمال الإصابة بالسرطانات و بالتشوهات الخلقية.

IV إشكالية النفايات النووية، تدبيرها والبدائل البيئية.

1- إشكالية النفايات النووية وتصنيفها:

من أكبر المشاكل التي تطرحها النفايات النووية ضرورة تخزينها وعزلها عن المحيط الإحيائي لمدة زمنية طويلة جدا، لأن انتهاء نشاطها الإشعاعي بفضل التناقص الإشعاعي يتطلب على الأقل انتظار أزيد من 20 مرة مدة عمر نصفها. وهذا سيتوجب مدد تخزين تنتمي للسلم التاريخي أو الجيولوجي. مثلا تساوي هذه المدة 640 سنة بالنسبة للنفايات المحتوية على السيزيوم 137 (عمر نصفه 32 سنة) وتساوي 490000 سنة بالنسبة للنفايات المحتوية على البلوتونيوم 239 (عمر نصفه 24500 سنة). لا أحد يضمن مقاومة حاويات النفايات طيلة هذه المدة.

تصنف النفايات النووية حسب معيارين رئيسيين: مدة نشاطها الإشعاعي الذي يمكن تحديده بحساب عمر النصف للمادة المشعة، ومستوى هذا النشاط الذي يتناسب مع خطورتها. وهكذا يمكن تمييز:

- **النفايات ذات النشاط المرتفع والعمر الطويل (النوع C):** تتكون أساسا من النفايات القادمة من قلب المفاعل النووي، تتميز بنشاط إشعاعي مرتفع لمدة مئات أو آلاف أو ملايين السنين.

- **النفايات ذات النشاط الضعيف والمتوسط والعمر القصير (النوع A):** تتكون أساسا من النفايات التكنولوجية للمراكز النووية (صبغات، وسترات ومعدات...) ومختبرات البحث ومختلف مستعملي المواد إشعاعية النشاط (مستشفيات ومختبرات التحاليل والصناعات المنجمية والغذائية والمعدنية...) التي تلوثت خلال استعمالها. لا تتعدى مدة إشعاعها 300 سنة.

- **النفايات ذات النشاط الضعيف جدا أو (TFA):** تتكون من المواد الناجمة عن تفكيك المواقع النووية.

- **النفايات ذات النشاط الضعيف والعمر الطويل (النوع B):** نفايات ناجمة عن معالجة الأورانيوم ونفايات الكرافيت المستعمل في المفاعلات.

الوثيقة 12: إشكالية النفايات النووية وتصنيفها

ماذا يقصد بالنفايات النووية، قارن بين أنواع النفايات النووية وحدد أكثرها خطورة مبررا ذلك

* النفايات النووية هي كل مادة إشعاعية النشاط أصبحت غير قابلة للتدوير أو إعادة الاستعمال ويجب تخزينها.

- * تختلف النفايات النووية من حيث مدة نشاطها الإشعاعي (العمر) ومستوى هذا النشاط الذي يتناسب مع خطورتها، وعلى هذين المعيارين يتم تصنيفها.
- * تتميز بعض النفايات النووية بنشاط إشعاعي قد يستمر ملايين السنين، مما يجعل الإنسان غير قادر على التحم فيها.

2 - تدبير النفايات النووية:

(أ) جمع النفايات النووية:



برميل معدني لجمع النفايات النووية

تخلط النفايات بمواد تتميز بمقاومة الإشعاعات وعوامل وعوامل الحث عبر الزمن، مثل الزجاج أو الإسمنت، ثم توضع في حاويات خاصة (من الاسمنت، أو الصلب غير قابل للتأكسد أو حاويات مزججة...)

(ب) تخزين النفايات النووية:


تخزن النفايات النووية ذات النشاط الإشعاعي المرتفع في أماكن تستجيب لمجموعة من الشروط وتسمح بإعادة استغلالها مستقبلًا. ومن بين هذه الشروط:

- منع دوران الماء الذي يمكن أن يتلف الحاويات وينقل النشاط الإشعاعي الموجود في النفايات.

- الحد من تسرب المواد المشعة خارج الحاويات وتثبيتها داخل الخزانات لأطول مدة ممكنة.

- تأخير أو تقليص هجرة المواد المشعة التي قد تخرج من الخزانات أو من الطبقة الجيولوجية.

- اختيار مواقع تخزين بها طبقات صخرية (طينية أو كرانيتية أو ملحية) مستقرة جيولوجيا وتتميز بمواصفات تحد من انتشار وتسرب المواد الإشعاعية النشطة.




حدد بإيجاز شروط تخزين النفايات النووية

13 تخزين النفايات النووية

K.Zekrite.doc

تتمثل أكبر هموم تدبير النفايات في كيفية تخزينها وعزلها عن المحيط الإحيائي لمدة طويلة. وبذلك تتخذ تدابير خاصة خلال التغليف والتخزين.

V حصيلة عامة في شكل خطاطة.



الفصل الرابع:

مراقبة جودة وصحة الأوساط الطبيعية

مقدمة

أمام ارتفاع مختلف أشكال التلوث الناتجة عن استعمال الإنسان للمواد العضوية وغير العضوية، لجأت أغلب الدول إلى نهج سياسات بيئية ووضع قوانين قصد تفادي تجاوز تراكيز بعض الملوثات الحدود الخطيرة على الأوساط الطبيعية (الماء، الهواء والتربة) وعلى الصحة.

- فما المعايير المعتمدة في مراقبة جودة وصحة الأوساط الطبيعية؟

1 | معايير قياس جودة الأوساط المائية.

6- معايير فيزيائية كيميائية:

تمكن عدة تقنيات فيزيائية كيميائية من القيام بعدة قياسات، من بينها قياس تركيز بعض المواد الموجودة في الماء خاصة المواد الملوثة. تستعمل بعض هذه التقنيات في عين المكان (قياس درجة الحرارة، قيمة، والتوصيلية الكهربائية...) وأخرى في المختبر للكشف عن الكلورورات والنترات والفوسفات. تعطي الوثيقة 1 بعض هذه المعايير لتقدير جودة الماء.

درجة الجودة تنازلية					
4	3	2	1B	1A	مستوى الجودة المعايير
ملوثة	رديئة	متوسطة الجودة	جيدة	ممتازة	
30	25	22	20		درجة الحرارة
150	70	25			المواد العالقة
80	40	25	20		DCO
25	10	5	3		DBO5
8	2	0,5	0,1		NH4
2	1	0,3	0,1		NO3
100	50				NO2
	250				SO4
1000	400	200	100		Cl
	3	5	7		O ₂ المذاب

* Demande biologique en O₂ = **DBO₅**
الطلب البيولوجي للأوكسجين خلال 5 أيام:
يعبر عن كمية O₂ اللازمة لتحلل المواد العضوية المتوفرة في الماء من طرف البكتيريا الحيهوائية خلال 5 أيام، ويقاس في درجة حرارة 20°C وفي الظلام (تجنباً لتأثير عملية التركيب الضوئي). تستعمل وحدة mm³/L.

* Demande chimique en O₂ = **DCO**
الطلب الكيميائي للأوكسجين:
يعبر عن كمية O₂ اللازمة لأكسدة جميع المواد القابلة للتأكسد كيميائياً، ويقاس في نفس ظروف قياس **DBO₅**

1 | المعايير الفيزيائية الكيميائية لتقدير جودة المياه
* ماذا يقصد ب DCO، DBO5 لماذا تعتبر هذه المعايير مقياساً للتلوث؟
* استنتج من خلال هذه الوثيقة خصائص الأوساط المائية الجيدة.
K.Zekrite.doc

* تشير هذه التوابث إلى كمية المواد العضوية القابلة للتأكسد الموجودة في الماء، لأن ارتفاع كميتها في هذا الوسط، يعد مؤشراً على تلوث الماء.

* يمكن اعتبار الماء جيدا عندما:

- يتضمن كمية قليلة من المواد العضوية (قيم DBO5 و DCO صغيرة، O2 المذاب مرتفع).
- يتضمن كمية قليلة من المواد المعدنية: الكلورورات، النترات، الفوسفات...
- حرارة منخفضة (20°C حرارة مثلى)

3 - معايير بيولوجية:

* تعتمد هذه التقنية على حساب عدد بعض الكائنات الحية اللاقارية الموجود في الماء:

تقدير درجة تلوث المياه باعتماد المؤشرات البيولوجية: تقدير المعامل الإحيائي					
العدد الكلي للوحدات الصنافية في العينة					
≥16	11à15	6à10	2à5	1	
المعامل الإحيائي					
10	9	8	7	-	مطويات الأجنحة، بنات اليوم ①
9	8	7	6	5	زغبيات الأجنحة ②
9	8	7	6	-	بنات اليوم، ثنائيات الصدفة ③
8	7	6	5	5	نصفيات الأجنحة، يعاسيب، قشريات، حزونات الماء. ④
8	7	6	5	-	الأزبل، العلق، نصفيات الأجنحة ⑤
7	6	5	4	3	ديدان، يرقات، كيريونوم ⑥
7	6	5	4	3	يرقات ذباب الزهور ⑦

حدود التلوث ماء غير ملوث ماء ملوث



- نأخذ عينة من المجرى المائي ونحدد المجموعة اللاقارية المؤشرة (الأكثر حساسية للتلوث) من جهة، ومن جهة أخرى العدد الكلي للوحدات الصنافية الموجودة في العينة.

- يعطي تقاطع السطر المقابل للمجموعة المؤشرة مع العمود المقابل لعدد الوحدات الصنافية، قيمة المعامل الإحيائي.

* يدل المعامل الإحيائي على درجة تلوث الماء: كلما قلت قيمة المعامل الإحيائي، كلما قلت جودة الماء:

- معامل من 0 إلى 5: ماء ملوث.

- معامل من 6 إلى 10: ماء غير ملوث.

تطبيق:

لنعتبر عينة مائية تتضمن الكائنات التالية:

الوحدات الصنافية	بنات اليوم	يعاسيب	علق	ثنائية الصدفة
العدد	04	02	05	02
المجموع	13			

* حدد قيمة المعامل الإحيائي وصنف الماء المدروس أجوبة:

- نحدد أولا المجموعة اللاقارية المؤشرة للعينة، يعني الأكثر حساسية: إنها مجموعة بنات اليوم، ثنائيات الصدفة = الوحدة الصنافية رقم ③.
- نحسب مجموع الوحدات الصنافية: 13.
- نقرأ الرقم الموجود في نقطة التقاطع: بنات اليوم/13: ← المعامل الإحيائي = 7 ← الماء المدروس غير ملوث.

II معايير مراقبة جودة الهواء.

قصد تخفيض عواقب تلوث الهواء على الصحة، حددت المنظمة العالمية للصحة (I) التراكيز التي لا ينبغي تجاوزها لمجموعة من المواد الملوثة كالدقائق العالقة و O₃ و NO₂ و SO₂ ولا احترام هذه التوصيات يقوم كل بلد بوضع محطات مراقبة جودة الهواء في عدة نقط.

المعايير الوطنية	مراكش (دجنبر 2000)		الرباط (ماي 1997)		المعدل السنوي لـ (ug/m ³) NO ₂
	حي النخيل	باب دكالة	المحطة الطرقية	دار السلام	
100	4,5	135,6	144	8	المعدل السنوي لـ (ug/m ³) NO ₂
100	1,7	84,6	68	12	معدل 8 ساعات لـ (ug/m ³) NO ₂
100 (OMS)	70,9	69,2	-	-	معدل 8 ساعات لـ (ug/m ³) SO ₂
200	-	-	261	188	المعدل السنوي لـ (ug/m ³) SO ₂



محطة متنقلة لقياس جودة الهواء الجوي

قياس بعض توابع جودة الهواء بالرباط ومراكش عن تقرير لمصلحة الهواء والمختبر الوطني للبيئة 2002

مراقبة جودة الهواء الجوي

K.Zekrite.doc

3

III معايير تقدير جودة التربة.

* يشكل التنوع البيولوجي معيارا جيدا لجودة التربة التي يمكن تقديرها بواسطة المعامل الإحيائي لجودة التربة (IBQS). يعتمد في حساب هذا المعامل على الفونة الكبيرة للتربة وهي مجموعة بيئية محددة توجد في أغلب التربة، منها ما هو مرشتر جيد على جودة التربة وما هو حساس لاختلالها، ويتم حسابه بالصيغة التالية:

$$IBQS = \sum \ln(Di+1) \cdot Si$$

Di: معدل وفرة أصناف الفونة المؤشرة الموجودة في 10 عينات من التربة
Si: قدرة تمييز هذه الأصناف

* تمنح لعينات التربة نقطة تتراوح بين 1 و 20 وتحدد جودة التربة انطلاقا من الجدول التالي:

IBQS	النقطة الممنوحة	فئة الجودة	تقدير الجودة
282-685	1-4	I	رديئة
686-1089	5-8	II	متوسطة
1090-1492	9-12	III	جيدة
1493-1997	13-17	IV	جد جيدة
1998-2300	18-20	V	فضلى


تقدير جودة التربة باستعمال المعامل الإحيائي IBQS

4

IV صحة الأوساط الطبيعية.

تعاني أنواع النباتات والوحيش بالمغرب من تناقص أعدادها، فحوالي 1670 نوع من النباتات مهدد حاليا بالانقراض، منها 475 صنف نادر ومستوطن. وقد اختفت أنواع معروفة من الوحيش منذ بداية القرن العشرين، كالثدييات البحرية والبرية، وبعض أصناف الطيور، وأسماك المياه العذبة. ويهدف إنشاء المحميات والمنتزهات إلى حماية الأنواع الحيوانية والنباتية النادرة أو المهددة بالانقراض مع حظر المس بالأنواع المحمية. وتعتبر بذلك مواقع ذات أهمية بيولوجية وبيئية، تمكن من الحفاظ على التنوع البيولوجي.


وقد مكن ظهور المعاهدات البيئية المنبثقة عن مؤتمر ريو 1992، المصادق عليها من طرف المغرب من الإسراع في تنسيق وتفعيل مسلسلات المحافظة والاستعمال المستدام للموارد الطبيعية. بذلك حظيت مختلف المحميات الطبيعية الوطنية باهتمام مجموعة من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني (كمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والمرصد الوطني للبيئة وجمعية الرفق بالحيوان والمحافظة على الطبيعة وجمعية مدرسي علوم الحياة والأرض).



المنتزه الوطني لتوبقال من المناطق ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية، يتميز بتنوع بيولوجي هائل، ويعد موطناً لحماية حيوان الأروي المغربي

5 المنتزه الوطني لتوبقال

K.Zekrite.doc



المعجم

- * **النفايات المنزلية:** مجموع النفايات الناجمة عن الأنشطة المنزلية للأسر (وكذا أنشطة المطاعم والفنادق والمحلات التجارية).
- * **الانتقاء:** Le tri عملية تهدف إلى فرز المواد بعضها عن بعض لأجل إعادة تدويرها. تفرز المواد حسب أصنافها الأولية (زجاج، ورق، بلاستيك...) أو حسب أصنافها الثانوية (زجاج أبيض، قارورات pvc*...).
- * **إنتاج السماد العضوي Compostage** عملية تتمثل في المعالجة البيولوجية للنفايات العضوية، حيث تخضع لتفسيخ هوائي تحت تأثير متعضيات مجهرية (بكتيريا، فطريات) والحيوانات الدقيقة (ديدان الأرض، قراديات...) التي تتغذى على النفايات العضوية (بروتينات، سيليلوز...) وتحولها إلى سماد عضوي = composte
- * **إنتاج البيوغاز = غاز الميثان** عملية تتمثل في المعالجة البيولوجية للنفايات العضوية حيث تخضع لتفسيخ لاهوائي تحت تأثير بكتيريا مولدة للميثان، والتي تتغذى على المواد العضوية لجلب الطاقة الضرورية لنموها، وينجم عن ذلك طرح غازات إحيائية يشكل الميثان النسبة العالية منها.
- * **الترميد = Incinération** تقنية، تتمثل في حرق النفايات داخل فرن معد لهذه العملية تحت درجة حرارة عالية (بين 800 إلى 1000°C) بحضور الأوكسجين. تستغل الطاقة الحرارية الناتجة في إنتاج بخار الماء الذي يستعمل في التدفئة وفي توليد الكهرباء، يحرر كل 1 طن من المحروقات ما يعادل 258KW من الطاقة.
- * **الليكسيفيا =** عصير النفايات: سائل ناتج عن ترشيح الماء عبر النفايات.
- * **الاحتباس الحراري Effet de serre** ظاهرة طبيعية مسؤولة عن احتفاظ الأرض بمعدل درجة حرارة تساوي 15°C حيث يعيد الغلاف الجوي (غازات، بخار الماء) جزءا من الإشعاعات الحمراء إلى الأرض، وهو ما يرفع من حرارتها.
- * **الغازات الدفيئة:** هي الغازات التي تساهم في الاحتباس الحراري من بينها نذكر CO₂، بخار الماء.
- * **الأوزون** هو غاز O₃، حيث يشكل طبقة حول الأرض (الستراتوسفير) على علو ما بين 15 و 50Km.
- * **الستراتوسفير =** الطبقة المتوسطة للغلاف الجوي (علو ما بين 10 و 50Km).
- * **الأمطار الحمضية:** تساقطات مطرية ذات Ph حمضي تنتج عن تفاعل كيميائي بين ماء الغلاف الجوي وغازات أكاسيد الآزوت أو أكاسيد الكبريت ينتج عنه حمض النيتريك (HNO₃) أو حمض الكبريتيك (H₂SO₄)
- * **ماء ملوث:** حسب المنظمة العالمية للصحة، نعني بتلوث الماء كل تغير للخصائص الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية، أو كل إلقاء لمواد سائلة أو غازية أو صلبة في الماء، من شأنه أن يلحق ضررا أو يجعل هذا الماء خطرا أو ضارا بالصحة العمومية وأمن الأفراد وراحتهم.
- * **المد الأسود:** بقع سوداء أساسها انتشار النفط في المحيطات إثر حوادث ناقلات البترول.
- * **Smog:** خليط الغازات والعناصر العالقة في الهواء الناتجة عن التلوث والتي تشكل ضبابة فوق المدن الصناعية.

* **التخاصب eutrophisation**: مظهر من مظاهر تلوث البحيرات يتمثل في اخضرار سطحها وهو ناتج عن التكاثر المفرط للطحالب بفعل غنى هذه الأوساط بالأملاح المعدنية الناجمة عن الاستعمالات الفلاحية.

* إنتاج **الوقود العضوي = البيواتانول** : كحول إيثيلي ينتج عن ظاهرة تخمر تقوم بها كائنات مجهرية حيث تتغذى على سكريات القمح، الذرة والشمندر.

* **نويذة**: نواة الذرة المميزة بعدد معين من البروتونات والنوترونات.

* **التفتت النووي**: تحول غير قابل للقلب لنواة مشعة إلى نواة أخرى. ويكون مصحوبا بإرسال إشعاعات.

* **نشاط إشعاعي**: تفتت طبيعي لنواة غير مستقرة إلى نواة متولدة أكثر استقرارا مع انبعاث دقيقة أو عدة دقائق، تكون إشعاعات نشيطة. وهذه الظاهرة عشوائية وتلقائية.

* **عمر النصف demi vie**: هي المدة الزمنية التي يتطلبها تفتت نصف كتلة المادة المشعة. مثلا إذا كانت الكمية البدئية من الأرانسيوم ^{238}U هي 1g، فستبقى 0,5g من هذه المادة المشعة بعد مضي $4,46.10^9$ سنة، أم النصف الآخر فسيتمتت إلى ^{234}Th .

* **الفصيلة المشعة**: هي مجموع العناصر المشعة الناتجة عن التفتت التدريجي لنفس العنصر المشع الأصلي.

* **النظير الإشعاعي النشاط Isotope radioactif** : هي المادة التي تمكن خاصياتها الذرية من إصدار إشعاعات مؤينة.

* **Sievert (sv)**: وحدة لقياس النشاط الإشعاعي وتعبّر عن الآثار البيولوجية للإشعاعات على المتعضي.

* **النفايات النووية**: هي كل مادة إشعاعية النشاط أصبحت غير قابلة للتدوير أو إعادة الاستعمال ويجب تخزينها. تختلف النفايات النووية من حيث مدة نشاطها الإشعاعي (العمر) ومستوى هذا النشاط الذي يتناسب مع خطورتها، وعلى هذين المعيارين يتم تصنيفها.

* **DBO₅ = Demande biologique en O₂** = الطلب البيولوجي للأوكسجين خلال 5 أيام هو كمية O₂ اللازمة لتحلل المواد العضوية المتوفرة في الماء من طرف البكتيريا الهوائية خلال 5 أيام، ويقاس في درجة حرارة 20°C وفي الظلام (تجنبا لتأثير عملية التركيب الضوئي). تستعمل وحدة mm³/L.

* **DCO = Demande chimique en O₂** = الطلب الكيميائي للأوكسجين: يعبر عن كمية O₂ اللازمة لأكسدة جميع المواد القابلة للتأكسد كيميائيا، ويقاس في نفس ظروف قياس DBO₅

* تشير **DBO₅** و **DCO** إلى كمية المواد العضوية القابلة للتأكسد الموجودة في الماء، لأن ارتفاع كميتها في هذا الوسط، يعد مؤشرا على تلوث الماء.

* **المعامل الإحيائي** = معيار بيولوجي يحدد درجة جودة الماء (ملوث أو غير ملوث) ويعتمد على حساب عدد بعض الكائنات الحية اللاقارية الموجود في الماء.

* **المعامل الإحيائي لجودة التربة (IBQS) indice biotique de qualité du sol**. يعتمد في حساب هذا المعامل على الفونة الكبيرة للتربة وهي مجموعة بيئية محددة توجد في أغلب التربة، منها ما هو مؤشر جيد على جودة التربة وما هو جد حساس لاختلالها، ويتم حسابه بالصيغة التالية:

$$IBQS = \sum \text{Ln}(D_i+1) \cdot S_i$$

D_i: معدل وفرة أصناف الفونة المؤشرة الموجودة في 10 عينات من التربة
S_i: قدرة تمييز هذه الأصناف

المراجع

- ◀ في رحاب علوم الحياة والأرض (الكتاب المدرسي) السنة الثانية من سلك البكالوريا شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية ومسلك العلوم الزراعية.
- ◀ علوم الحياة والأرض تمارين وحلول: TOP SVT
- ◀ الامتحانات الوطنية للبكالوريا مادة علوم الحياة والأرض شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية.